

PREPARACIÓN DILATACIÓN ENDOSCÓPICA DE RECTO

Indicaciones importantes para realizar el examen

- **No debe tener ayuno para realizar el procedimiento**
- El paciente debe asistir 15 minutos antes de la hora asignada con un acompañante mayor de edad.
- Autorización vigente.
- Traiga historia clínica y resultados de procedimientos anteriores.
- Uñas de manos y pies sin pintar.
- Disponer alrededor de 2 horas para la realización de su procedimiento.
- Verifique con anterioridad si debe cancelar algún valor en nuestra Institución, exigido por su aseguradora.
- Si usted utiliza lentes de contacto debe retirarlos durante la realización del procedimiento.
- Su acompañante deberá registrarse al ingreso del edificio con la cédula de ciudadanía. Usted no deberá registrarse, con su cédula podrá ingresar al edificio por los torniquetes.

Traer:

- Ropa Cómoda.
- Orden médica original.
- Carné de su entidad de salud.
- Documento de identidad.

Para afiliados a Allianz, Mapfre, Metlife, Compañía Suramericana, Compañía de Seguros Bolívar, Famisanar PAC, por favor envíenos a vuelta de correo la orden médica del procedimiento y carné del paciente para generar la autorización correspondiente con anterioridad a la fecha de la cita.

Para afiliados a Colmédica, Axa Colpatria, Liberty, Coomeva Medicina Prepagada, Medplus y Colsanitas deberá solicitar previo al procedimiento autorización a su asegurador y enviárnosla a vuelta de correo.

Si usted ha sido operado de ileostomía o colostomía NO realice esta preparación. Comuníquese con nosotros al 6427200 opción 2.

PREPARACIÓN

Debe comprar 2 bolsas de: ENEMA TRAVAD (cada una viene por 133 ml)

El día anterior a la realización del examen hasta la hora del almuerzo podrá consumir cremas, carne, pollo, pescado o huevos. Después deberá tener una dieta líquida en la cual podrá ingerir los siguientes productos: café, Té, aromática, caldos sin residuos, Gatorade, agua de panela, gaseosa o jugos en agua (preferiblemente que no sean rojos).

El día del examen el desayuno deberá hacerse antes de las 7:00 AM, el almuerzo deberá realizarse con dieta líquida sin lácteos.

Una (1) hora antes de salir para el examen debe colocar un Enema Travad vía rectal y tratar de retenerlo el mayor tiempo posible, luego lo evacua, enseguida debe colocar el otro enema y repetir el mismo procedimiento. Una vez evacuado éste puede salir para el consultorio.

Si desea obtener mayor información al respecto, visite nuestra página web www.gutmedica.com o comuníquese a nuestro PBX 6427200 opción 2.