

## POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA DE RECTO

### Indicaciones importantes para realizar el examen

- El paciente debe asistir 15 minutos antes de la hora asignada con un acompañante mayor de edad.
- El día del procedimiento debe traer resultados de PT y PTT no mayores a una (1) semana.
- Uñas de manos y pies sin pintar.
- Verifique con anterioridad si debe cancelar algún valor en nuestra Institución, exigido por su aseguradora.
- Su acompañante deberá registrarse al ingreso del edificio con la cédula de ciudadanía. Usted no deberá registrarse, con su cédula podrá ingresar al edificio por los torniquetes.
- Disponer alrededor de 90 minutos para el procedimiento.
- Si usted utiliza lentes de contacto debe retirarlos durante la realización del procedimiento.

### Traer:

- Ropa Cómoda.
- Orden médica original.
- Carné de su entidad de salud.
- Documento de identidad.

*Para afiliados a Allianz, Mapfre, Metlife, Compañía Suramericana, Compañía de Seguros Bolívar, Famisanar PAC, por favor envíenos a vuelta de correo la orden médica del procedimiento y carné del paciente para generar la autorización correspondiente con anterioridad a la fecha de la cita.*

*Para afiliados a Colmédica, Axa Colpatria, Liberty, Coomeva Medicina Prepagada, Medplus y Colsanitas deberá solicitar previo al procedimiento autorización a su asegurador y enviárnosla a vuelta de correo.*

**Si usted ha sido operado de ileostomía o colostomía o sufre de estreñimiento (Menos de tres evacuaciones a la semana), deberá recibir indicaciones adicionales a esta preparación.** Comuníquese con nosotros al 6427200 opción 2.

## PREPARACIÓN HORARIO DE LA MAÑANA (7 AM A 9 AM)

### COMPRA SU PREPARACION INTESTINAL:

### POLIETILENGLICOL (NULYTELY O CLEAROVAC) CUATRO SOBRES (4)

El día anterior a la realización del examen:

Podrá desayunar normalmente a las 6 de la mañana. A partir de ese momento deberá tomar líquidos transparentes que podrá consumir hasta 4 horas antes de la realización de su examen. (Té, aromática, caldos sin residuos, Gatorade, agua de panela, gaseosa o jugos en agua (preferiblemente que no sean rojos).

A la hora del almuerzo podrá consumir una porción pequeña de pechuga de pollo a la plancha sin condimentos y puré de papa sin leche.

NO DEBE consumir frutas, granos, pan, arroz, o verduras.

Las frutas con semilla como la granadilla deberán suspenderse 8 días antes del examen

A partir de las 7:00 pm debe disolver 2 sobres de Polietilenglicol (Nulytely o Clearovac) en 2 litros de agua y tomar la preparación cada 10 o 15 minutos hasta terminar.

Este medicamento actúa limpiando el colón, lo cual genera urgencia de ir al baño (diarrea constante).

A las 11:00 pm debe disolver los 2 sobres restantes de Polietilenglicol (Nulytely o Clearovac) en 2 litros de agua y tomar la preparación cada 10 o 15 minutos hasta terminar.

**Tener en cuenta que cuatro (4) horas antes del procedimiento no puede tomar más líquido.**

Si desea realizar el procedimiento bajo sedación asistida, **no puede** realizar actividades que requieran de concentración después de realizado el procedimiento (conducción, manejo de maquinaria pesada, etc.) debido a que sus reflejos pueden quedar afectados por el resto del día.

Todos los objetos personales (reloj, celular, joyas, billeteras, etc.) deberán ser entregados al acompañante antes de ingresar al procedimiento.

Si desea obtener mayor información al respecto, visite nuestra página web [www.gutmedica.com](http://www.gutmedica.com).